

“หมา – แมว” กัดข่วน รับประทานแพทย์ระวังโรคพิษสุนัขบ้า มีอาการ **ตาย** ทุกราย

สาเหตุโรคพิษสุนัขบ้า

เกิดจากเชื้อไวรัสเรบิลส์ สัตว์นำโรค ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด

แต่สัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย คือ สุนัข

การติดต่อ เกิดจากสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน หรือ ถูกน้ำลายกระเด็นเข้าบาดแผล

อาการของโรค

เริ่มจาก 2-3 วันแรกผู้ป่วยจะเบื่ออาหารเจ็บคอ ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว มีไข้ อ่อนเพลีย ซา เจ็บ เลี้ยว คันอย่างรุนแรง
ที่แผลและสัตว์ ต่อมาจะมี อาการกระสับกระส่าย กล้ามเนื้อสั่นสั่น ไม่ชอบเสียงดัง เพื่อเชื้อ กลืนลำบาก โดยเฉพาะ
ของเหลว กลัมน้ำ และกล้ามเนื้อขากระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หรืออาจชัก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และ ตาย ไป
ที่สุด

ลดความเสียหายจากการถูกสัตว์ทำร้ายด้วยหลัก 5 ย. ต่อไปนี้คือ

1. อย่าแหย่สุนัขให้โกรธ
2. อย่าเหยียบหาง หัว ตัว ขา หรือทำให้อึดใจ
3. อย่าเข้าไปแย่งสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า
4. อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร
5. อย่ายุ่ง หรือเข้าไปใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักและไม่เป็นเจ้าของ

วิธีการปฏิบัติตน เมื่อถูกสุนัขและแมว กัด ข่วน ถูกกัดต้องฉีดวัคซีนทุกราย

1. ล้างแผลให้สะอาดทันที ด้วยน้ำสะอาด และสบู่หลายๆ ครั้ง จากนั้นล้างซ้ำด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อ
2. ใส่ยาฆ่าเชื้อในกลุ่มไอโอดีน เช่น พิงเจอร์ หรือโพวิโดนไอโอดีน (เบตาดีน)
3. กักหมา สังกัดอาการและกักบริเวณสัตว์ที่กัดเรา ไว้ประมาณ 10-14 วัน
4. หากหมอ รีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันบาดทะยัก รวมถึงได้รับยาตามอาการ

วิธีการป้องกัน

1. ผู้เลี้ยงสุนัขต้องนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนเมื่อสุนัขอายุ 2-4 เดือน ในปีแรกควรฉีด 2 ครั้ง หลังจากนั้นต้องฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปี
2. ไม่ปล่อยให้สุนัขออกไปนอกบ้านตามลำพัง เมื่อนำสุนัขออกนอกบ้านต้องใส่ สายจูง ถ้าสุนัขคุ ควรสวมเครื่องป้องกันสุนัขกัด
3. ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง
4. หากพบเห็นสัตว์สงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

“ สุนัขกัดต้องรีบแก้ ล้างแผลใส่ยา กักหมา หากหมอ ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด”

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดไม่ครบ ไม่ตรงตามกำหนดนัด อาจตาย