



อนุกรม อนุโลมา เที่ยวป่าชายเลน

@ท่าข้าม ฉะเชิงเทรา





คณะผู้จัดทำ

เจ้าของ

เทศบาลตำบลท่าข้าม

บรรณาธิการ

นายสาโรช ทัพพี

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม

กองบรรณาธิการ

กองวิชาการและแผนงาน

จัดทำโดย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน

คณะที่ปรึกษาทิตติมศักดิ์

นางสมจิตร พันธุ์สุวรรณ

นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

นางสมทรง สุขุมมะสวัสดิ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

นายสมศักดิ์ จริญญาเลิศ

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

นายณัฐภู ชวัลวรศรี

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

นางพรภินันท์ ภูทวี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้ามทุกท่าน

คำนำ

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกำลังเป็นที่นิยม เพราะเป็นคำตอบสำหรับกระแสการรักสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบในเรื่องระบบนิเวศที่มีให้เห็นเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชื่นชม ศึกษา เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพพืชพันธุ์และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้นๆ

ดังนั้นเทศบาลตำบลท่าข้ามจึงได้จัดทำคู่มือท่องเที่ยว “**ดูนก ดูโลมา เที่ยวป่าชายเลน**” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตตำบลท่าข้าม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ทุกท่านได้รับความรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ตั้งแต่ป่าชายเลนซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีคุณค่าอย่างมากมายมหาศาล ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม เพราะป่าชายเลนเป็นที่รวบรวมความหลากหลายด้านชีวภาพ เป็นที่วางไข่ เป็นแหล่งอาหาร และเป็นที่กำบังของสัตว์น้ำ สัตว์บก และสัตว์ปีก บนเกาะธรรมชาติท่าข้าม ท่านจะได้พบกับความหลากหลายของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและนกนานาชนิด ผ่านเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่มีระยะทางกว่า 1,500 เมตร รวมถึง หอชมวิว ศาลาพักผ่อนท่องเที่ยว รวมทั้งธรรมชาติรอบเกาะกลางปากแม่น้ำบางปะกง ที่ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและยังได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านริมสองฝั่งน้ำบางปะกงที่ใช้ชีวิตผูกพันกับสายน้ำและธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน

นอกจากนี้จุดเด่นอีกอย่างของปากแม่น้ำบางปะกงก็คือในช่วงปลายฝนต้นหนาว(เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) ของทุกๆ ปี จะมีโลมาธรรมชาติอพยพเข้ามาหาอาหารและแสดงพฤติกรรมต่างๆ ให้ได้พบเห็นเป็นประจำ จนทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็น Unseen in Thailand ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลท่าข้าม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตตำบลท่าข้าม จะก่อให้เกิดส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอันมีค่าอย่างยั่งยืนสืบต่อไปให้ลูกหลานได้ใช้ศึกษาเรียนรู้



สารบัญ

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|---------------------|
| 3 | คำนำ | 15 | นกนางนวลเกลบเคราขาว |
| 4 | สารบัญ | 16 | นกกาบน้ำเล็ก |
| 6 | ระบบนิเวศรอบเกาะฯ | 17 | นกกาบน้ำปากยาว |
| 8 | เกาะธรรมชาติท่าข้าม | 18 | นกยางโทนใหญ่ |
| 10 | ตุนก | 19 | นกยางเปี้ย |
| 12 | นกที่สามารถพบได้บริเวณเกาะฯ | 20 | นกแขวก |
| 14 | นกกระทง | 21 | นกปากห่าง |



22 ดูโลมา

24 โลมาอิวรดี

25 โลมาหัวบาตรหลังเรียบ

26 โลมาหลังโหนก

27 สถานการณ์โลมา

29 การพบเห็นโลมา

30 เทียวป่าชายเลน

32 รายชื่อสัตว์หน้าดินบริเวณเกาะฯ

34 ปูก้ามดาบ

35 ปูแสม

36 ปูทะเล

37 ปลาตีน

38 รายชื่อพันธุ์ไม้ป่าชายเลน

40 แสมทะเล

41 โปรงแดง

42 แคทะเล

43 ฝาดดอกแดง

44 ฝาดดอกขาว

45 จาก

46 ขลุ่

47 โกงกางใบเล็ก

48 โกงกางใบใหญ่

49 ลำพู

50 ลำแพน

51 โพทะเล

52 ตะบูนขาว

53 ตะบูนดำ


54 ขั้นตอนการปลูกต้นกล้าฯ

55 ที่พักหลับสบาย

56 ร้านนี้สิเด็ด!


58 Cafe สุดชิค

59 การเดินทาง



ระบบนิเวศรอบเกาะธรรมชาติ ทำข้าม

โลมา



โลมาที่เข้ามาหาอาหารบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง มีด้วยกัน 3 ชนิด คือ โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และโลมาหลังโหนก แต่ที่สามารถพบเห็นได้บ่อยคือ โลมาอิรวดี

เทศบาลตำบลท่าข้าม



สัตว์ป่าชายเลน



แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง ปลา ปูทะเล ปูแสม ปู ก้ามดาบหลากสีสัน รวมถึง ปลาตีนขนาดใหญ่ ที่สามารถพบเห็นได้โดยง่าย

นกที่สามารถพบเห็นได้บริเวณปากแม่น้ำ
บางปะกงมีทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ เช่น
นกกระทง นกยาง นกกาน้ำ และนกนางนวล
เป็นต้น

นก



อุทยานแห่งชาติปางสีดา



พันธุ์ไม้ป่าชายเลน

สายน้ำนำพามา ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลน
ทำให้เกาะธรรมชาติท่าข้ามแห่งนี้ มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนมากกว่า 30 ชนิด

เกาะธรรมชาติทำข้าม

“เกาะธรรมชาติทำข้าม” หรือเกาะนกเกาะซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของสาหร่ายน้ำบางปะกง เป็นเวลาหลายสิบปีจนกลายเป็นผืนดินขนาดใหญ่กลางปากแม่น้ำบางปะกง ปัจจุบันเกาะธรรมชาติข้ามมีพื้นที่ประมาณ 125 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง อยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2530 มีสภาพเป็นป่าไม้ชายเลน ประกอบไปด้วยต้นจากและไม้แสมเป็นส่วนใหญ่ โดยในอดีตเกาะธรรมชาติทำข้ามแห่งนี้ได้มีชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ในการตัดจากขาย รวมถึงได้มีการขุดบ่อเพื่อเลี้ยงกุ้ง ซึ่งได้มีการตัดต้นไม้ออกไปเป็นจำนวนมาก และได้เลิกเลี้ยงกุ้งไปเมื่อปี พ.ศ. 2535 ซึ่งป่าไม้ชายเลนได้เริ่มฟื้นตัวเองมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น แต่ก็เต็มไปด้วยความล่าช้า



สภาพโดยทั่วไปยังคงเป็นป่าจากและต้นแสมเป็นส่วนใหญ่ มีไม้อื่นแซมบ้างแต่ไม่มากนัก จากการสำรวจทางอากาศของสำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2544 พบว่า บริเวณรอบเกาะมีต้นไม้ป่าชายเลนขึ้นหนาแน่น แต่ในช่วงกลางเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามีต้นไม้ขึ้นประปราย โดยเฉพาะบริเวณด้านใต้ของเกาะ ส่วนพื้นที่ด้านตะวันตกเฉียงใต้มีดินเลนออกใหม่จะมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อน้ำลง


สภาพบนเกาะชายเลนแห่งนี้ มีพรรณไม้ที่หายากหลายชนิด เนื่องจากเกาะนี้
ไม่มีคนอาศัยอยู่และโดยรอบเกาะมีตลอดน้ำ (คลองซอยเล็กๆ) ทำให้มีกุ่ม หอย ปู ปลา
ไหลมาตามกระแสน้ำขึ้นลงกลายเป็นแหล่งอาหารของนกนานาชนิด นอกจากนี้ ยังมี
ปู ก้ามดาบหลายสี และปลาตีนตัวใหญ่กว่าที่อื่นๆ การดำเนินงานที่ผ่านมาในปัญหาบุกรุก
ป่าชายเลน เทศบาลตำบลท่าข้ามได้สนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยยึดถือปฏิบัติในการฟื้นฟูสภาพ
ป่าชายเลนเพราะมีความสำคัญทางระบบนิเวศและมีความหลากหลายทางชีวภาพ
เช่น การจัดกิจกรรมปลูกป่า การสร้างคอนโดปู การจัดทำแนวป้องกันกระแสน้ำลม
และการจัดกิจกรรมเก็บขยะบนเกาะ

ภาพกิจกรรม



ទូរក

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម





นกที่สามารถพบได้ บริเวณเกาะธรรมชาติ ท่าข้าม

เทศบาลตำบลท่าข้าม



รายชื่อนก	ชื่อวิทยาศาสตร์
นกกระทุง	<i>Pelecanus philippensis</i>
นกนางนวลเกลบเคราขาว	<i>Chlidonias hybrida</i>
นกกาบน้ำ์เล็ก	<i>Microcarbo niger</i>
นกกาบน้ำ์ปากยาว	<i>Phalacrocorax fuscicollis</i>
นกยางโทนใหญ่	<i>Ardea alba</i>
นกยางเปีย	<i>Egretta garzetta</i>
นกแซงก	<i>Nycticorax nycticorax</i>
นกปากห่าง	<i>Anastomus oscitans</i>



นกกระทุง

Pelecanus philippensis

ชื่อสามัญ : Spot-billed pelican

เทศบาลตำบลท่าช้าง



ลักษณะทั่วไป : นกกระทุงเป็นนกขนาดใหญ่ มีความยาวจากปากถึงปลายหางประมาณ 52–60 นิ้ว มีขาสั้นใหญ่ ปากยาวแบนข้างใต้มีถุงสีออกม่วงขนาดใหญ่ บริเวณขอบปากบนมีจุดสีน้ำเงินเข้มอยู่เป็นระยะตามความยาวของจะงอยปาก ตีนมีพังผืดสีเหลืองซึ่งเต็มระหว่างนิ้วทุกนิ้วคล้ายเป็ด ม่านตาสีแดง แข็งและตีสีเนื้อ สามารถว่ายน้ำได้ดี บินได้สูง ในฤดูผสมพันธุ์ ขนจะเปลี่ยนเป็นสีเทาเงินในช่วงบนของลำตัว ส่วนช่วงล่างจะเป็นสีขาว แต่ถ้าไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์ ปีก หางและส่วนใต้ลำตัว จะมีสีน้ำตาล เช่นเดียวกับนกกระทุงที่ยังไม่โตเต็มที่ ทั้งตัวผู้และตัวเมียรูปร่างและสีขนเหมือนกัน นกกระทุงชอบอยู่เป็นฝูง กินปลา, กุ้ง, กบ หรือสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆ เป็นอาหารและหาอาหารด้วยกัน ถ้าตัวใดตัวหนึ่งทำอะไรตัวอื่นจะทำตาม เวลาที่อยู่เฉยๆ จะหันหน้าไปทางเดียวกันหมด เวลาบินจะหอดคอเข้ามา บินกันเป็นแถวเรียงหนึ่ง บางครั้งบินเป็นรูปตัว V ส่วนใหญ่จะบินเป็นรูปขึ้นบันไดกว้างๆ รังสร้างด้วยกิ่งไม้ใหญ่ๆ วางสานกันบนต้นไม้สูงๆ ขนาดของรังมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ฟุต วางไข่ครั้งละประมาณ 3 ฟอง ไข่มีสีขาว ทั้งตัวผู้และตัวเมียช่วยกันกกไข่ประมาณ 4–5 อาทิตย์ จึงฟักเป็นตัว

นกนางนวลแกลบเคราขาว

Chlidonias hybrida

ชื่อสามัญ : Whiskered Tern



ลักษณะทั่วไป : เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวด้านหลังมีสีเทาคล้ำ ท้ายทอยมีสีดำ ส่วนหน้าผากและกระหม่อมเป็นสีขาว แก้ม คอและท้องมีสีขาว ปากและขาสีดำ หางเป็นแฉกลึก ในฤดูผสมพันธุ์หน้าผากหัว และท้ายทอยจะมีสีดำ ปากสีแดงเกือบดำมักหากินอยู่เหนือผิวน้ำตามชายทะเลและแหล่งน้ำจืด ในขณะที่บินย่นหัวและปากลงต่ำเพื่อมองหาอาหารและจะใช้วิธีทิ้งตัวลงน้ำเพื่อใช้ปากจับเหยื่อ



นกกาน้ำเล็ก

Microcarbo niger

ชื่อสามัญ : Little cormorant,
Javanese cormorant

เทศบาลตำบลท่าช้าง



ลักษณะทั่วไป : เป็นนกกาน้ำขนาดเล็ก มีความยาวจากปลายปากถึงปลายหาง 51-56 เซนติเมตร น้ำหนัก 360-525 กรัม ความกว้างระหว่างปลายปีกทั้งสอง 90 เซนติเมตร ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน ขนตามลำตัวมีสีดำเหลือบน้ำเงิน ตรงปีกมีสีน้ำตาลปน บริเวณรอบตามีจุดสีขาวขนาดเล็ก ใต้คางมีสีครีม แต่ขนชุดนอกและในฤดูผสมพันธุ์แตกต่างกัน นอกฤดูผสมพันธุ์ ปากสีเนื้อแกมเทาหม่น ขนทั่วทั้งหัว, ลำคอ, ลำตัว ปีกและหางสีน้ำตาลแกมดำ แต่ขนบริเวณไหล่และปีกสี ค่อนข้างเทา แต่ขอบขนสีดำ คางค่อนข้างขาว ในฤดูผสมพันธุ์ ปากสีค่อนข้างดำ หัว, ลำคอ, อก, ท้อง, สีข้างและขนคลุมใต้โคนหางเปลี่ยนเป็นสีดำเหลือบน้ำเงินและเขียว บนกระหม่อม ขนคลุมหู และท้ายทอยมีลายริ้วสีขาว

อาศัยอยู่ตามหนองบึง, แม่น้ำ, ลำคลอง หรือท้องนา จับปลาขนาดเล็กจำพวกปลาตะเพียนกินเป็นอาหาร ส่วนใหญ่ชอบอยู่ตามลำพัง บางครั้งอาจพบอยู่รวมกันเป็นฝูงบ้าง ชอบดำน้ำไล่จับปลาเป็นอาหาร เมื่อขึ้นจากน้ำมักจะยืนกางปีกตากแดดให้ขนแห้ง

นกกาน้ำเล็กผสมพันธุ์ในราวเดือนกรกฎาคม ทำรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่รวมกันหลายรังบนต้นเดียวกัน ทำรังด้วยกิ่งไม้เล็กๆ ขัดสานไว้อย่างหยาบๆ และวางไข่ครั้งละ 2-4 ฟอง จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศไทย

นกกาน้ำปากยาว

Phalacrocorax fuscicollis

ชื่อสามัญ : GF Indian cormorant,
Indian shag



ลักษณะทั่วไป : เป็นนกในวงศ์นกกาน้ำ (Phalacrocoracida) พบตามแหล่งน้ำชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีความแตกต่างจากนกกาน้ำเล็ก (P. niger) ที่มีขนาดใกล้เคียงกันคือ ตาสีฟ้า หัวเล็ก หน้าผากลาด มีปากยาวแคบโค้งเป็นตะขอที่ปลายปาก คล้ายนกกาน้ำใหญ่ แต่ขนาดเล็กกว่าปากเรียวบางกว่า หัว คอ และลำตัวด้านล่างดำ คอใต้คอ กลางอก และกลางท้องอาจมีสีขาวแซม หลังน้ำตาลเหลืองเป็นมัน ในชนชุดผสมพันธุ์ หัว คอ ออก และลำตัวด้านล่างดำเป็นมัน หน้าผากและเหนือตามีขีดขาวเล็กๆ กระจาย ข้างหัวด้านท้ายมีกระจุกขนสีขาว เมื่อเวลาบินมักจะยืดคอไปตรงๆ ว่ายน้ำและจับปลาได้เก่ง แต่เมื่อขึ้นแล้วต้องกางปีกผึ่งให้แห้ง ในประเทศไทยจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกยางโทนใหญ่

Ardea alba

ชื่อสามัญ : Great egret



เทศบาลตำบลท่าช้าง



ลักษณะทั่วไป : เป็นนกกลυν้ำขนาดใหญ่ในวงศ์นกยาง (Ardeidae) มีขนสีขาวตลอดตัว คอยาว มีลักษณะคล้ายนกยางโทนน้อย แต่ปากจะยาวกว่า หัวไม่กลมเหมือนนกยางโทนน้อย นกยางโทนใหญ่เป็นนกขนาดใหญ่มีขนาดความยาวลำตัวประมาณ 90 เซนติเมตร สีขาวตลอดตัว คอยาว ปากยาวแหลมมีสีเหลือง ตาเหลือง ไม่มีเปื้อนขาวและนิ้วเท้าดำ ในฤดูผสมพันธุ์มีขนประดับเป็นเส้นยาวๆ อยู่บนหลังและยาวเลยหางออกไปเล็กน้อย นกยางโทนทั้งตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน ในฤดูผสมพันธุ์ปากจะมีสีดำ นกยางโทนใหญ่หากินตามตึ๋นที่น้ำท่วมถึง หนองบึง ทะเลสาบ และตามป่าชายเลน กินสัตว์น้ำ กบ เขียด แมลง และสัตว์ขนาดเล็กอื่นเป็นอาหาร นกยางโทนใหญ่ผสมพันธุ์ในฤดูฝนและอยู่กันเป็นฝูงชอบทำรังรวมกันอยู่บนต้นไม้ต้นเดียวกันกับนกยางชนิดอื่น รังทำด้วยกิ่งไม้แห้งๆ เล็กๆ ขัดสานกัน มีแอ่งตรงกลางสำหรับเพศผู้และเพศเมียช่วยกันทำรัง กกไข่ และเลี้ยงดูลูก วางไข่คราวละ 3-4 ฟอง ระยะฟักไข่ 25-26 วัน

นกยางเปียว

Egretta garzetta

ชื่อสามัญ : Little egret

ลักษณะทั่วไป: อยู่ในวงศ์นกยาง (Ardeidae) นกมีสีขาว มีปากเรียวยาวสีดำ ขาค้ายาวแต่นกเฝ้าทางตะวันตกมีเท้าเหลืองเป็นนกน้ำ หากินตามน้ำตื้นๆ และบนพื้น กินสัตว์เล็กต่างๆ อยู่ผสมพันธุ์เป็นฝูงบ่อยครั้งอยู่กับนกน้ำสายพันธุ์อื่นๆ ทำรังขนาดใหญ่ (platform nest) จากก้านไม้ พุ่มไม้ และหญ้า วางไข่เป็นสีเขียวอม

น้ำเงินที่ทั้งพ่อแม่ฟักลูกนกจะมีขนกราว 6 สัปดาห์

นกโตแล้วยาว 55-65 เซนติเมตร รวมปีกกว้าง 88-106

เซนติเมตรหนัก 350-550 กรัม ขนปกติขาวทั้งหมด แต่ก็มีนกสีเข้มกว่าที่โดยมากเป็นสีเทาออกน้ำเงินๆ ในฤดูผสมพันธุ์นกมีขนเป็นเปี้ยวยาวสองเส้นที่ต้นคอเหมือนกับหงอนซึ่งยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ปลายแหลมและมีรูปเรียว มีขนคล้ายๆ กันที่อกด้วยแต่ส่วนที่เป็นขนรูปตะขอ (barb) จะห่างๆ กันมากกว่า ยังมีขนยาวที่สะบัก (กระดูกฐานที่ไหล่ด้านหลังซึ่งรองรับกระดูกปีก) ที่มีส่วนขนรูปตะขอยาวไม่ยัดเข้าด้วยกันโดยขนอาจยาวถึง 20 เซนติเมตร ช่วงฤดูหนาว ขนจะคล้ายกับช่วงฤดูผสมพันธุ์แต่ขนที่สะบักจะสั้นกว่าและดูเหมือนขนปกติมากกว่า ปากยาวเรียวดำโดยบริเวณระหว่างตากับจมูกก็ดำด้วยมีผิวโล่งสีเทาออกเขียวๆ ที่ฐานขากรรไกรล่างและรอบๆ ตาซึ่งมีม่านตาเหลืองขาวสีดำแต่เท้าสีเหลือง ลูกนกคล้ายกับผู้ใหญ่ช่วงที่ไม่ผสมพันธุ์แต่มีขาตาออกเขียวๆ และเท้าเหลืองอ่อนๆ กว่าและอาจมีขนสีเทาๆ หรือน้ำตาลๆ อยู่บ้าง



นกแขวก

Nycticorax nycticorax

ชื่อสามัญ : Black-crowned night heron,
Night heron



เทศบาลตำบลท่าช้าง



ลักษณะทั่วไป : เป็นนกชนิดหนึ่งจำพวกนกยาง จัดเป็นนกยางหรือนกกระยางชนิดที่ปรับตัวให้หากินในเวลากลางคืนได้ ซึ่งต่างจากนกยางทั่วไปที่หากินในเวลากลางวัน โดยได้ชื่อมาจากเสียงร้องที่ดัง “แคว๊ก” ที่มักจะร้องดังขณะบินผ่านยามค่ำคืน เป็นนกที่มีแหล่งอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึงที่มีไม้ยืนต้นขึ้นรกๆ หรือแม้แต่ตามสวนสาธารณะในเมืองใหญ่ มักเกาะอยู่กับกิ่งไม้หรือตอไม้หนึ่งๆ เพื่อรอจับเหยื่อ ซึ่งได้แก่ สัตว์น้ำรวมถึงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเล็กๆ แม้จะหากินในเวลากลางคืนเป็นหลักและไม่ค่อยบินไกลในเวลากลางวัน แต่พฤติกรรมการหากินในเวลากลางวันก็เป็นเรื่องปกติ พบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของโลก พบได้ทั้งในเขตอบอุ่นและเขตร้อน ยกเว้นทวีปออสเตรเลีย นกแขวกทางตอนใต้ของทวีปอเมริกามีกระหม่อมและหลังสีเทาอ่อนกว่าที่อื่น นอกจากนี้บริเวณส่วนหัวและอกก็เป็นสีน้ำตาลอมเทา ประชากรทางตอนเหนือจะอพยพบินสู่ทางใต้ในช่วงฤดูหนาว ทำรังวางไข่บนต้นไม้ มีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นอาณานิคมปะปนกับนกน้ำประเภทอื่นๆ โดยเฉลี่ยในตัวเมียจะมีเส้นขนยาวคล้ายเปียที่ท้ายทอยสั้นกว่าตัวผู้ และมีขนาดตัวเล็กกว่า ม่านตาจะค่อยๆ เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดงถ้าเมื่ออายุได้ 3 ปีขึ้นไป ในวัยที่ยังไม่โตเต็มที่มีลำตัวเต็มไปด้วยลวดลายสีน้ำตาลกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม มีแต้มสีขาวตามขนปีก ซึ่งลวดลายเหล่านี้จะหายไปและแทนที่ด้วยกระหม่อมและหลังสีเทาเข้ม ตัดกับลำตัวสีเทาอ่อนจนเกือบขาวเมื่อมีอายุมากขึ้น

นกปากห่าง

Anastomus oscitans


ชื่อสามัญ : Asian openbill




ลักษณะทั่วไป : จัดอยู่ในวงศ์นกกระสา (Ciconiidae) จุดเด่นที่ไม่เหมือนใครก็คือปากที่ยามหุบจะเหลือช่องตรงกลาง ทำให้มันคาบเปลือกหอยโข่งและหอยเชอรี่ที่ทั้งกลมทั้งลื่นได้อย่างชำชอง เมื่อจับหอยได้แล้วมันจะคาบไปหาทำเลเหมาะๆ เพื่อใช้จะงอยปากทำหน้าที่เหมือนแหนบจิกเนื้อหอยออกมากิน ตัวผู้และตัวเมียคล้ายกัน มีขายาว คอยาว ปากใหญ่ส่วนกลางของปากห่างออกเพื่อคาบหอยโข่งซึ่งกลมลื่นได้ ขนตามตัวมีสีขาวมอมๆ หางมีสีดำแกมน้ำเงิน ขนปลายปีกมีสีเหมือนและเป็นแถบสีดำ นกปากห่างมีลำตัวยาว 32 นิ้ว ชอบอยู่เป็นฝูง ทำรังบนต้นไม้ทำรังด้วยริ้วไม้แบบนกยางหรือรังกา ออกไข่ครั้งละ 2-4 ฟอง ตัวผู้และตัวเมียจะผลัดกันกกไข่ ในการผสมพันธุ์ เวลาตัวผู้ขึ้นทับตัวเมียนั้น นกตัวผู้จะใช้เท้าจับขอบปีกหน้าของตัวเมียไว้แน่น ทั้งสองตัวจะกระพือปีกช่วยการทรงตัว ตัวผู้จะแกว่งปากของมันให้กระทบกับปากของตัวเมียอยู่ตลอดเวลาที่ทำการทับ ลูกนกเมื่อออกจากไข่ใหม่ๆ จะไม่มีขน หลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีขนฟูๆ คลุม อีกราวเกือบ 2 เดือนก็มีปีกกางแข็งแรงแล้วก็เริ่มหัดบิน

ດູໂລມາ

ເກສບາດຕຳບລາກຳບ້ານ





โลมาอิรวดี

Irrawaddy dolphin

วงศ์ : Delphinidae

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Orcaella brevirostris




เทศบาลตำบลท่าข้าม



โลมาอิรวดี พบเห็นได้บ่อยและง่ายที่สุดใกล้ปากแม่น้ำบางปะกง ตลอดจน
อ่าวไทยตอนใน ชื่อโลมาอิรวดีมาจากแหล่งที่พบครั้งแรกโดยชาวตะวันตกในแม่น้ำ
อิรวดี ประเทศพม่า ซึ่งโลมาชนิดนี้สามารถว่ายน้ำเข้าไปอาศัยอยู่ตามลำน้ำขนาดใหญ่
ในบังคลาเทศ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และอินโดนีเซีย (Mahakan river-East
Kalimantan) เมื่อตัวเต็มวัยยาว 2 - 2.75 เมตร ลูกแรกเกิดยาว 1 เมตร ไม่มีจะงอยปาก
(Beak) หัวกลมมนคล้ายโลมาหัวบาตรหลังเรียบ มากลำตัวสีน้ำเงินเทาด้านหลัง
และสีเทาจางด้านท้อง และมีครีบหลังเล็ก อยู่กึ่งกลางลำตัวก่อนไปหาง

โลมาอิรวดี ว่ายน้ำค่อนข้างช้า มักโผล่ครีบหลังขึ้นมา
ให้เห็นเพียงช่วงสั้นๆ ชอบโผล่
ส่วนหัวขึ้นมาเหนือน้ำและมอง
ออกไปโดยรอบ การรวมฝูงล่า
ปลาเป็นอาหาร ทำให้พวกมัน
เป็นผู้ช่วยที่ดีของชาวประมง
เนื่องจากฝูงปลาที่แตกตื่นจะ
เตลิดเข้าไปติดอวนของชาว
ประมง



โลมาหัวบาตรหลังเรียบ

Finless Porpoise

วงศ์: Phocoenidae
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Neophocaena Phocaenoides



โลมาหัวบาตรหลังเรียบ มีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกับโลมาอิรวดีทั้งสีผิว ลักษณะหัว จะงอยปาก และพฤติกรรมแต่มีขนาดเล็กกว่า คือระหว่าง 1.0-1.9 เมตร และไม่มีครีบหลัง เป็นโลมาที่อาศัยใกล้ชายฝั่ง ในเขตน้ำตื้นแม้จะพบแพร่กระจาย ในเขตอ่าวไทย แต่ก็พบเห็นได้ยากเนื่องจากไม่มีครีบหลังให้สังเกตจากรายงานของ ชาวประมงบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง ระบุว่าบางครั้งพบหากินร่วมกับโลมาอิรวดี



โลมาหลังโหนด

Indo-Pacific humpback dolphin

วงศ์: Delphinidae

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Sousa chinensis

เทศบาลตำบลท่าช้าง




โลมาหลังโหนด มีขนาดใหญ่กว่าโลมาอริวติมาก โตเต็มที่มีขนาดถึง 3.2 เมตร จุดเด่นอยู่ที่สีผิวที่ขีดขาว หรือสีชมพูจางๆ พบทั่วไปใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลจีนใต้ รวมถึงชายฝั่งอ่าวไทย โลมาหลังโหนด มีรูปร่างยาว ปากเรียวยาว สีที่ลำตัวมีหลากหลายทั้งสีน้ำตาลเหลืองซีด เทาจางๆ ไปจนถึงขาวอมชมพูและยิ่งอายุมาก สีที่จะจางลงจะยิ่งจางลง เนื่องจากมีขนาดใหญ่ สีอ่อน และว่ายน้ำได้ช้า โลมาหลังโหนดจึงเห็นได้ง่าย และเห็นได้จากระยะไกล ประกอบกับครีบหลังที่ฐานกว้างโค้งไปด้านหลังมาก มีขนาดเกือบ 1 ใน 3 ของหลังยังทำให้เห็นได้เด่นชัด อย่างไรก็ตามโลมาชนิดนี้ค่อนข้างระแวงระวังเรือ ไม่ชอบว่ายเข้ามาใกล้หรือว่ายน้ำเร็ว แต่ชอบใช้หางตีน้ำหรือตะแคงตัวว่ายน้ำ



สถานการณ์โลมา

สถานการณ์ความอยู่รอดของโลมาอิรวดีทั่วโลกกำลังตกอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง รวมทั้งในประเทศไทยเอง นอกจากจำนวนประชากรโลมาอิรวดี ที่มีน้อยเนื่องจากลักษณะทางชีววิทยา หรือพฤติกรรมของโลมามีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อยู่สูง เช่น ความต้องการพื้นที่อาศัยที่มีลักษณะเฉพาะ หรือการตกถูกเพียงคราวละ 1 ตัว รวมทั้งจำนวนของโลมาอิรวดียังลดลงอย่างรวดเร็ว มีสาเหตุหลักๆ จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์คุกคามสัตว์ร่วมโลกทุกชนิด



โลมาทั้ง 3 ชนิด ที่พบได้บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง แม้จะไม่ถูกคุกคามจากการล่าโดยตรง แต่พวกมันก็ต้องเผชิญกับภัยคุกคามอื่นๆ โดยมนุษย์ ทั้งจากกิจกรรมทางน้ำที่หนาแน่น การขนส่งและการประมง

การนำเรือออกไปล่าตามเพื่อติดตามดูพฤติกรรม โดยขาดความเข้าใจ ปัญหามลพิษ การทำลายป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก ที่จะเป็นห่วงโซ่อาหารให้กับสัตว์น้ำขนาดใหญ่ต่อไป

จากสถิติในแต่ละปีโลมาลดลงจำนวนมาก โดยเฉพาะโลมาอิรวดีจำนวนไม่น้อยต้องจบชีวิตลง เพราะเครื่องมือประมงและการทำประมงโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์มีโลมาอิรวดีประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ติดเครื่องมือประมงตาย (ในบริเวณทะเลสาบสงขลา) บางส่วนถูกล่าเพื่อนำมาทำอาหารสำหรับผู้ชอบเปิบพิสดาร และโลมาอิรวดีก็ยังเข้าข่าย **“อาจได้รับผลกระทบอันเนื่องจากการค้า”** เนื่องจากมีโลมาอิรวดีจำนวนมากต้องถูกกวาดต้อน



เข้าธุรกิจแสดงโชว์สัตว์น้ำ ด้วยความที่ โลมาอิรวดีเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมน่ารัก ฉลาดและแสนรู้ ประกอบกับ สามารถ อยู่ได้ในน้ำจืด ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการ ดูแลรักษาน้อยกว่าโลมาที่อยู่น้ำเค็มมาก จึงทำให้โลมาอิรวดีเป็นที่ต้องการของ ผู้ประกอบการและทำให้เข้าใกล้ภาวะ สูญพันธุ์เข้าไปทุกที จำนวนธุรกิจแสดง สัตว์น้ำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมี สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 80 แห่ง และกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกถึง 13 แห่ง นั้นหมายความว่าหากสถาน แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหนึ่งแห่งต้องใช้โลมา อิรวดี 5 ตัว ในการแสดงจะต้องมีโลมา อิรวดีในธรรมชาติถูกกว้านซื้อไม่ต่ำกว่า 65 ตัวเลยทีเดียว

ตามกฎหมายไทยโลมาอิรวดีได้รับการ จัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 138 (สัตว์ป่าคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าที่มี รายชื่ออยู่ในพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ห้ามล่า ห้าม

ครอบครอง หรือห้ามเพาะพันธุ์เว้นแต่จะ ได้รับอนุญาต) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ได้ทรงมีพระราชประสงค์ ให้ช่วยกันอนุรักษ์โลมาอิรวดีซึ่งเป็นสัตว์ หายาก พร้อมทั้งทรงรับไว้เป็นสัตว์ใน พระบรมราชินูปถัมภ์ และในระดับโลก สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) ก็จัดให้โลมาอิรวดีอยู่ในบัญชีตัวแดง (Red List) โดยอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ อย่างวิกฤต (Critically Endangered) และจากการประชุมภาคีอนุสัญญาว่า ด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิด สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือ ไซเตส(CITES) ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 2-14 ตุลาคม 2547 ที่ประชุมได้ เห็นชอบ ให้เลื่อนสถานภาพจากเดิมที่อยู่ใน บัญชี 2 ของอนุสัญญา CITES มาอยู่ใน บัญชีที่ 1 กล่าวคือ ห้ามซื้อขายระหว่าง ประเทศเด็ดขาด ยกเว้นเพื่อการวิจัยทาง วิชาการตามข้อเสนอของประเทศไทย



การพบเห็นโลมา

เนื่องจากโลมาที่ปากแม่น้ำบางปะกงเป็นโลมาธรรมชาติ ท่านจึงอาจพบเห็นพฤติกรรมต่างๆ ของโลมาแตกต่างกันไป เช่น การหาอาหาร การลอยตัวขึ้นมาหายใจตามธรรมชาติ การผสมพันธุ์ การคลอดลูก และอื่นๆ รวมทั้งจำนวนที่พบเห็นในแต่ละครั้งซึ่งไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องของจำนวน สถานที่และเวลาได้



โลมาไม่ใช่ปลา

หลายคนคงนึกสงสัยว่าทำไมไม่ใช่ปลา ทั้งที่มีลักษณะคล้ายปลาลองมาดูกันว่าต่างกันอย่างไร

1. โลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
2. โลมาใช้ปอดในการหายใจ แต่ปลาใช้เหงือก
3. โลมาออกลูกเป็นตัว แต่ปลาออกลูกเป็นไข่
4. หางโลมาขนานกับพื้นน้ำ แต่ปลาดั้งฉากกับพื้นน้ำ




รักย์โลมา เราทำได้

การที่จะอนุรักษ์หรือรักษาร่วมกับการใช้ประโยชน์ด้วยนั้น ต้องคำนึงว่าเราอนุรักษ์หรือรักษาอะไร หากเป็นสิ่งมีชีวิตจะอนุรักษ์เค้าให้อยู่ตราบนานเท่านานก็ต้องช่วยกันดูแลบ้านและแหล่งอาหารเค้าด้วยจึงจะเรียกว่าอนุรักษ์

เที่ยว ป่าชายเลน





รายชื่อสัตว์หน้าดิน
บริเวณเกาะธรรมชาติ
ท่าข้าม

เทศบาลตำบลท่าข้าม



ชื่อสัตว์หน้าดิน	วงศ์
ปูก้ามดาบ	<i>Ocypodidae</i>
ปูแสม	<i>Family Grapsidae</i>
ปูทะเล	<i>Portunidae</i>
ปลาตีน	<i>Gobidae</i>



นกจากทั่วโลก
ที่หายากและน่าสนใจ




ลักษณะทั่วไป : ลำตัวมีความยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร มีกระดองเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูด้านหน้าโค้งมน ด้านข้างปลายสอบเข้าหากัน ด้านหลังนูนออกเล็กน้อย นัยน์ตามีก้านตายาว ซึ่งเคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่ปูต้องการ สีของกระดองเป็นสีส้มปนน้ำตาล ก้ามขวาที่มีขนาดใหญ่ของตัวผู้มีปลายก้ามหนีบสีขาวนวล โคนสีแดงอมชมพู เมื่อพบอันตรายจะหดก้ามเข้าเก็บในเบ้าตา ปากของปูอยู่ใต้ตา มีฟันกราม 6 คู่ และรยางค์เล็กคล้ายเขี้ยวอีกหนึ่งคู่ ปูหายใจด้วยเหงือก โดยดูดออกซิเจนจากน้ำซึ่งไหลเข้าทางช่องที่อยู่หน้าก้ามหนีบ ทางน้ำออกจะอยู่บริเวณข้างๆ รยางค์ปาก

ตัวผู้มีลักษณะโดดเด่นคือมีก้ามข้างใดข้างหนึ่งใหญ่กว่าอีกข้าง ซึ่งจะใช้ก้ามข้างนี้ในการแบกไปมาเพื่อใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้ คู่ศัตรูและเรียกร้องความสนใจจากตัวเมีย ขณะที่ปูตัวเมีย ก้ามทั้ง 2 ข้างจะเล็กเท่ากัน

อาหาร : กินอินทรีย์สารและซากสัตว์

การขยายพันธุ์ : ปูก้ามดาบเวลาผสมพันธุ์ ตัวเมียอาจเลือกตัวผู้เป็นร้อยตัว เมื่อจับคู่ได้แล้ว ตัวผู้จะเป็นฝ่ายนำตัวเมียลงไปผสมพันธุ์ในรู โดยตัวผู้จะเป็นฝ่ายดูแลตัวเมียและไข่ที่บริเวณปากรู และรอจนกว่าให้ตัวเมียฟักไข่นอกมาเป็นตัวสมบูรณ์




ปูแสม

Meder's Mangrove Crab

วงศ์ : Family Grapsidae

ชื่ออื่น : ปูเค็ม

ลำตัวมีความยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร มีสีน้ำตาลดำ ปลายก้ามมีสีน้ำตาลแดง ขณะที่ชีวิตบริเวณช่องปากมีสีม่วงเป็นประกาย กระดองเกือบจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีกลุ่มขนสั้นๆ กระจัดกระจายอยู่บนกระดองยกเป็นสันเกือบตรง มีรอยหยักเหมือนฟัน 2 ซี่ ที่มุมนอกของเบ้าตาตอนกลางกระดอง ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับปากมีลักษณะโค้งนูนปลายแหลมเห็นได้ชัด สันข้างปากขนาดใกล้เคียงกันทั้งสองคู่ ร่องอกไม่ชัด แต่ร่องกันหัวใจเห็นได้ชัด บริเวณเหงือกมีสันเล็กๆ เฝียงอยู่ข้างละ 5-6 สัน ขอบหลังตาโค้งนูน แก้มทั้งสองข้างมีขนาดใกล้เคียงกัน



อาหาร : กินใบไม้และซากสัตว์ที่ผุเปื่อย

การขยายพันธุ์ : ปูเพศเมียเมื่อได้รับการผสมกับเพศผู้แล้ว ไข่จะเจริญอยู่ภายในกระดอง เมื่อไข่แก่เต็มที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ใต้จับปั้งบริเวณหน้าอก ฤดูที่วางไข่มี 2 ช่วง ช่วงแรกอยู่ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม ช่วงที่สองอยู่ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ไข่จะอยู่นอกกระดองประมาณ 14 วัน แล้วก็จะฟักเป็นตัว



ปูทะเล

Serrated Mud Crab

วงศ์ : Portunidae

ชื่ออื่น : ปูดำ, ปูขาว, ปูทองกลาง,
ปูทองโหลง, ปูทองแดง

เทศบาลตำบลท่าช้าง



ลักษณะทั่วไป : กระดองมีลักษณะกลมรีเป็นรูปไข่สีดำปนแดงหรือสีน้ำตาลเข้มขอบระหว่างนัยน์ตามีหนาม 4 อัน ส่วนด้านข้างนัยน์ตาแต่ละข้างมีหนามข้างละ 8-9 อัน ก้ามจะมีหนามแหลมส่วนขาอื่นๆ ไม่มีหนาม ตัวผู้จะมีก้ามขนาดใหญ่ แข็งแรงกว่าตัวเมียอย่างเห็นได้ชัด เมื่อโตเต็มที่อาจมีน้ำหนักถึง 3.5 กิโลกรัม เจริญเติบโตด้วยวิธีการลอกคราบ โดยตรงขอบหลังของกระดองจะเผยออกให้เห็นกระดองใหม่ที่ยังเป็นเนื้อเยื่อบางๆ ซึ่งเรียกว่า “สองกระดอง” ถ้าหากป็นตัวเมียที่มีความสมบูรณ์เพศจะมีไข่อยู่ในกระดองซึ่งพบมากในเดือนพฤศจิกายน ปลายสุดของขาคู่ที่ 2-4 มีลักษณะแหลม เรียกว่า “ขาเดิน” ทำหน้าที่ในการเดินเคลื่อนที่ ส่วนขาคู่ที่ 5 เป็นคู่สุดท้ายเรียกว่า “ขาว่ายน้ำ” ตอนปลายสุดของขาคู่นี้มีลักษณะแบนคล้ายใบพาย ใช้สำหรับว่ายน้ำ ปูทะเลในบางแหล่งจะมีสีที่แตกต่างกันออกไปมากมาย เช่น สีเขียวหม่น สีฟ้า สีขาวอ่อนๆ, สีเหลือง เป็นต้น

อาหาร : สัตว์น้ำขนาดเล็ก ซากพืช ซากสัตว์ต่างๆ

การขยายพันธุ์ : ฤดูการวางไข่ผสมพันธุ์ของปูทะเลอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม แม่ปูจะมีไข่ในระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม สามารถวางไข่ได้ตลอดทั้งปี โดยจะวางไข่ชุกชุมในระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ไข่ของปูทะเลจะมีสีส้มแดง เมื่อไข่แก่ขึ้นจะเป็นสีน้ำตาลเกือบดำ ซึ่งจะถูกล่อยออกมานอกกระดองบริเวณใต้จับปิ้ง




ปลาตีน

Mudskipper

วงศ์ : Gobiidae

ชื่ออื่น : ปลาจุ่มพรอด, ปลากระจิง

ลักษณะทั่วไป : ลำตัวมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 10-25 เซนติเมตร ตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียชอบอาศัยบนผิวนเลนมากกว่าในน้ำ ครีบก้นหรือครีบอกจึงมีลักษณะแข็งแรง บริเวณกระพุ้งแก้มที่ปิดเหงือกจะโป่งพองออกมา ทำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ส่วนหัวมีขนาดโต ลูกตาที่โป่งนูนอยู่บนหัวสามารถกลิ้งกลอกได้ ทำให้มองเห็นเด่นชัด



อาหาร : กินสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช่น ลูกกุ้ง, ลูกตัวอ่อนของสัตว์น้ำขนาดเล็ก, สาหร่าย, แบคทีเรียและซากสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนผิวนเลน

การขยายพันธุ์ : ฤดูผสมพันธุ์ปลาตีนตัวผู้จะมีสีขึ้นและมีอาณาเขตของการสืบพันธุ์ โดยจะมีการสร้างหลุมซึ่งมันจะไปกวาดโคลนมากองบนปากหลุม เราเรียกว่า “หลุมปลาตีน” ซึ่งปลาตีนตัวผู้และตัวเมียจะผสมพันธุ์ในหลุมที่ตัวผู้ขุดไว้ นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมหวงเขตแดน เมื่อมีปลาตีนตัวอื่นรุกล้ำ จะแสดงการกางครีบหลังชู และเคลื่อนไหวที่เข้าหาผู้รุกร้าทันที



รายชื่อพันธุ์ไม้ป่าชายเลน บริเวณเกาะธรรมชาติ ท่าข้าม

เทศบาลตำบลท่าข้าม



แสมทะเล

Avicennia marina (Forsk.) Vierh.


วงศ์ : AVICENNIACEAE

ชื่ออื่น : ปิปิต้า (ภูเก็ต); แสมขาว, ฝัฝเล

เทศบาลตำบลท่าข้าม



เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-ปานกลาง สูง 5-8 เมตร มีรากหายใจเป็นรูปคล้ายดินสอ ยาว 10-20 เซนติเมตร เนื้อผิวดิน หนาแน่นบริเวณโคนต้น ทรงต้นลักษณะเป็นพุ่มส่วนใหญ่มีสองลำต้นหรือมากกว่า เรือนยอดโปร่งใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามหนาแน่นที่ปลายกิ่ง ใบรูปไข่ปลายมน ผิวเรียบเป็นมัน หลังใบสีเขียวอมขาว ขอบใบเรียบ ใบมีวุ้นกลับหลัง ดอกช่อเชิงลด แตกที่ปลายกิ่ง ผลรูปไข่เบี้ยวแบน ปลายผลไม่มีจะงอย



ประโยชน์ : ลำต้นใช้ทำฟืนและถ่าน

สรรพคุณ : นำแก่นไปต้มผสมน้ำ ใช้ดื่มแก้ท้องร่วง

โปรงแดง

Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob.

วงศ์ : RHIZOPHORACEAE

ชื่ออื่น : โปรง, โปรงใหญ่;

ปรง (สมุทรสาคร, จันทบุรี); แสม (ใต้)



เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง สูง 7-15 เมตร โคนต้นมีพูพอนเล็กน้อย มีรากค้าจุนขนาดเล็ก รากหายใจรูปคล้ายเข่า อ้วนกลม ยาว 12-20 เซนติเมตร เนื้อผิวดิน สีน้ำตาลอมชมพู เรือนยอด เป็นกลุ่มกลม สีเข้ม กิ่งสีเขียว มีช่องอากาศเล็กๆ เปลือกสีชมพูเรื่อๆ หรือน้ำตาลอ่อน เรียบถึงแตกเป็นสะเก็ด ต้นแก่มีรอยแผลในช่องอากาศ เห็นเด่น ชัดสีน้ำตาลอ่อน

ประโยชน์ : เปลือกน้ำและยางใช้ทำผ้าบาติก
ใช้ย้อมแห อวน และเสื่อ

สรรพคุณ : เปลือกใช้ต้มกับน้ำ
ใช้ชะล้างบาดแผลได้



41

จากข้อมูลทางวิชาการ

แคทะเล

Dolichandrone spathacea Schum.

วงศ์ : BIGNONIACEAE

ชื่ออื่น : แคน้ำ, แคนา, แคป่า (กลาง)

แคฉา, แคป้อ, แคแค้นแท้ (เหนือ)

เทศบาลตำบลท่าข้าม



เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูง 4-10 เมตร
แตกกิ่งก้านน้อย เรือนยอดแผ่กว้าง แต่ละส่วนเมื่อแห้ง
จะเปลี่ยนเป็นสีดำ เปลือกสีเทา เรียบหรือแตกเป็น
ร่องตื้นๆ มีช่องอากาศตามลำต้น



ประโยชน์ : เนื้อไม้ใช้ทำเป็นเครื่องเรือนและหีบใส่ของ

สรรพคุณ : ใบนำไปทำเป็นยาขับปัสสาวะ ใช้รักษาแผลในปาก



ฝาดดอกแดง

Lumnitzera littorea Voigt

วงศ์ : COMBRETACEAE

ชื่ออื่น : ดำเสภาทะเล (พังงา, กระบี่, ตรัง)



เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงถึง 20 เมตร เปลือกสีน้ำตาลมีรอยแตกเป็นร่องลึก มีรากหายใจรูปคล้ายเข่า ใบเดี่ยวเรียงเวียนรอบกิ่ง ออกหนาแน่นที่ปลายกิ่ง แผ่นใบหนารูปรีแกมรูปไข่ปลายใบกลม เว้าตื้นๆ โคนใบรูปลิ้น ขอบใบหยักมน มีต่อมขนาดเล็ก ก้านใบสั้น ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ฐานรองดอกเป็นหลอด กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียวรูปไข่ กลีบดอก 5 กลีบ สีแดง

ประโยชน์ : เปลือกน้ำและยางใช้ทำผ้าบาติก
ใช้ย้อมแห อวน และเสื่อ
สรรพคุณ : เปลือกใช้ต้มกับน้ำ
ใช้ชะล้างบาดแผลได้



ฝาดดอกขาว

Lumnitzera racemosa Willd.

วงศ์ : COMBRETACEAE

ชื่ออื่น : ฝาด (กลาง, ใต้); ขวาด
(สมุทรสาคร); กะลุง (ชุมพร)

เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 8 เมตร
เปลือกขรุขระ สีน้ำตาลแดงมีรากหายใจ
ไม่เด่นชัด

ประโยชน์ : ใ้มนำมาใช้ก่อสร้างได้ดี

สรรพคุณ : ยอดอ่อนแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ



จาก

Nypa fruticans Wurmb.

วงศ์ : PALMAE

ชื่ออื่น : วัตติะ (มลายู-ใต้)

เป็นไม้จำพวกปาล์ม มีขนาดเล็ก ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดินมีรากอวบอ้วนอัดแน่นบริเวณกอเหง้ามีลักษณะคล้ายฟองน้ำ มักจะจมอยู่ในโคลน และอยู่ใต้น้ำขณะน้ำท่วม



ประโยชน์ : ใบนำไปมุงหลังคา ทำหมวก
วงจก ทำเป็นเสื่อ
สำหรับปิดแมลงและไม้กวาด
พอนจากใช้ทำเป็นเชื้อเพลิง

สรรพคุณ : ใบใช้ต้มกับน้ำ ดื่มแก้
อาการท้องร่วงได้

บลู่

Pluchea indica Less.

วงศ์ : COMPOSITAE

ชื่ออื่น : บลู (ใต้); หนวดจั่ว, หนวดวัว, หนวดจั่ว (อุดรธานี); กล้วยไส (จีนแต้จิ๋ว); กล้วยช (จีน)

เทศบาลตำบลท่าช้าง



เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก พุ่มตั้งตรง ขึ้นอยู่รวมกัน เป็นกอแตกกิ่งก้านมากสูง 1-1.5 เมตร มีขนเล็ก ละเอียด ปกคลุมตามกิ่ง

สรรพคุณ : ใบและต้นอ่อนนำมาต้ม

แล้วใช้อาบ ช่วยรักษาหิด ขี้เรื้อน
เปลือกนำมาสับเป็นชิ้นๆ มวนเป็น
บุหรี่ สูบแก้โพรงจมูกอักเสบได้




โกงกางใบเล็ก

Rhizophora apiculata Bl.

วงศ์ : RHIZOPHORACEAE

ชื่ออื่น : กงกาง (ระนอง); พังกาใบเล็ก (พังงา); พังกาทราย (กระบี่)

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมักขึ้นในดินเลนค่อนข้างอ่อน และมีน้ำทะเลท่วมถึงแบบสม่ำเสมอบริเวณชายฝั่งสูงประมาณ 20-30 เมตร ลำต้นแตกเป็นกิ่งก้านมาก มีรากค้ำจุนทำหน้าที่พยุงลำต้น เปลือกลำต้นเป็นสีเทา ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงกันข้าม ใบหนาเป็นมัน ลักษณะรูปมนค่อนข้างไปทางรูปใบหอก ปลายใบแหลม ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-8 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7-18 เซนติเมตร หรือเล็กกว่า ก้านใบยาวประมาณ 1.5-3 เซนติเมตร ส่วนหุบใบเป็นสีแดงเข้ม ยาวประมาณ 4-8 เซนติเมตร หุ้มใบอ่อนไว้ ใบเกลี้ยงทั้งหน้าและหลังใบ นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้ฝักโดยตรง ด้วยการเก็บฝักแก่และสมบูรณ์หรือเก็บฝักที่ร่วงหล่นในน้ำ (ฝักสมบูรณ์จะลอยน้ำ) เมื่อเก็บมาแล้วควรนำไปปลูกทันทีเพราะหากเก็บไว้นานความสามารถในการงอกจะลดลงไปตามระยะเวลา



จาก คู่มือ ป่าชายเลน

ประโยชน์ : ป่าโกงกางช่วยป้องกันรักษาชายฝั่งทะเลจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ และใช้เป็นแนวกำบังคลื่นลม ในอดีตนิยมนำเนื้อไม้มาใช้ทำฟืนและถ่าน เนื่องจากเป็นไม้ที่ให้ความร้อนสูงและนาน อีกทั้งยังมีขี้เถ้าเล็กน้อยและไม่เกิดสะเก็ดไฟเวลานำมาใช้

สรรพคุณ : ใบนำไปทำเป็นยาบ้วนปาก ใช้รักษาแผลในปาก

โกงกางใบใหญ่

Rhizophora mucronata Poir.

วงศ์ : RHIZOPHORACEAE

ชื่ออื่น : กงทอน (ชุมพร); กงกางนอก (เพชรบุรี);
กงเทง (นครปฐม); พังกาใบใหญ่ (ใต้)

เทศบาลตำบลท่าข้าม



เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มักขึ้นในบริเวณที่เป็นดินเลนปนทราย และมักจะขึ้นอยู่ในบริเวณที่ขุดติดกับแม่น้ำ สูงประมาณ 20-30 เมตร ลำต้นแตกเป็นกิ่งก้านมาก มีรากค้ำจุนทำหน้าที่พยุงลำต้น เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลเทา ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงกันข้าม ใบหนาเป็นมัน ลักษณะของใบเป็นรูปมนค่อนข้างไปทางรูปใบหอก ปลายใบแหลม ใบมีความกว้างประมาณ 5-13 เซนติเมตรและยาวประมาณ 8-18 เซนติเมตร ส่วนก้านใบยาวประมาณ 2.5-5.5 เซนติเมตร และยังมีหูใบสีแดงเข้มยาวประมาณ 5-9 เซนติเมตร หุ้มใบอ่อนไว้ นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้ฝักโดยตรง

ประโยชน์ : ป่าโกงกางมีความสำคัญอย่างมากสำหรับสัตว์ทะเลต่างๆ เนื่องจากเป็นที่วางไข่และฟักตัวอ่อน และเป็นแหล่งที่มีสภาพสมดุลทางธรรมชาติสูงมาก ในด้านอื่นๆ เปลือกของต้นโกงกางมีสารแทนนิน และฟีนอลจากธรรมชาติสูงมาก อีกทั้งยังมีราคาสูงที่สุด ซึ่งสารดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทำยา ทำหมึก ทำสี ใช้ในการฟอกหนัง ใช้ทำกาบสำหรับติดไม้ เป็นต้น

ลำพู

Sonneratia caseolaris (L.) Engl.

วงศ์ : SONNERATIACEAE

ชื่ออื่น : -



เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง-ใหญ่ สูง 8 - 20 เมตร
ไม่ผลัดใบ กิ่งห้อยย้อยลง รากหายใจปลายเรียว
โผล่เหนือน้ำ ใบเดี่ยวแตกตรงกันข้ามก้าน
ใบสีกมพู ใบรีสีเขียวเข้ม ผิวเรียบ เป็นมัน
ดอกเดี่ยวออกดอกที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยงสีเขียว
หุ้มไว้กลีบดอกสีชมพูออกแดงฐานดอกเป็นรูปถ้วย
ผลดิบและสุกสามารถรับประทานได้ ออกผลเดือน
ตุลาคม-กุมภาพันธ์

ประโยชน์ : ลำต้นใช้ทำจุกขวดและภาชนะ

ปิดฝาโอ่ง ไห

สรรพคุณ : ผลแก่นำไปตำ คั้นเอาน้ำ

ดื่มแก้ท้องร่วง



ลำแพน


Sonneratia ovata Back

วงศ์ : SONNERATIACEAE

ชื่ออื่น : -

เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง สูง 4-12 เมตร เรือนยอดแผ่ออกแตกกิ่งระดับต่ำ หากหายใจตั้งตรงรูปกรวยคว่ำเหนือผิวดิน ใบเดี่ยวแตกตรงกันข้ามฐาน ใบโค้งมน มีสีเขียวเป็นมัน ผิวใบเรียบ ดอกเดี่ยวที่ปลายกิ่ง 1-3 ดอก มีกลีบเลี้ยง 6-8 กลีบปลายกลีบเลี้ยงมนงอเข้ามีสีเขียวอ่อนฐานดอกเป็นรูปถ้วย ผลดิบและสุกสามารถรับประทานได้ออกดอกและผลตลอดปี

เทศบาลตำบลท่าข้าม



ประโยชน์ : ลำต้นใช้ทำเสาหรือคอกสัตว์ ยอดและใบแก่
ตำแล้วผสมน้ำใช้ฉีดพ่นป้องกันยุงลาย
สรรพคุณ : ลำต้นนำไปต้มกับน้ำ ดื่มแก้เมื่อยเคล็ด
ตามข้อ กระดูก และแก้อาการถ่ายเป็นเลือด

โพลทะเล

Thespesia populnea (L.)
Soland.ex Correa

วงศ์ : MALVACEAE

ชื่ออื่น : ปอกระหมัดไพร (ราชบุรี); ปอมัดไซ
(เพชรบุรี); บากู (ปัตตานี, มลายู-นราธิวาส)

เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 8-12 เมตร ลำต้นโค้ง
แตกกิ่งในระดับต่ำเรือนยอดแผ่กว้าง ใบเดี่ยวเรียงสลับ
รูปคล้ายหัวใจ เนื้อใบค่อนข้างหนาโคนใบเว้า ปลายใบแหลม
ดอกออกตามง่ามใบเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นคู่ ก้านดอกอ้วนสั้น
2-5 เซนติเมตร ผลเป็นผลแห้งแตกไม่มีทิศทางค่อนข้างกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร เปลือกแข็ง มีวงกลีบเลี้ยง
รูปคล้ายจานอยู่ที่ขั้วผล



ถูก
ดูไลมา
เก๋ยวป่า
ชายเลน

ประโยชน์ : เนื้อไม้ทำเป็นเครื่องเรือนหรือเครื่องดนตรี เปลือกใช้ทำเชือก
สายเบ็ดได้

สรรพคุณ : ยางจากผลตากันหูด ผลและใบตำพอก แก้หิด
เมื่อกินได้จากเปลือกสดมาแช่น้ำ รักษาโรครบบทางเดินอาหาร

ตะบูนขาว

Xylocarpus granatum Koen.

วงศ์ : MELIACEAE

ชื่ออื่น : กระบูน, กระบูนขาว,
ตะบูน (กลาง, ใต้)


เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง สูง 8-20 เมตร
ไม่ผลัดใบ แตกกิ่งใกล้โคนต้น มีพุ่มพองแผ่ออกคดเคี้ยว
ต่อเนื่องกับรากหายใจที่แบนคล้ายแผ่นกระดาน
เปลือกเรียบบางสีเหลืองเข้มเขียวอ่อน หรือสีน้ำตาล
อ่อนถึงน้ำตาลแกมชมพู ลักษณะคล้ายเปลือกต้นฝรั่ง
หรือตะแบก เปลือกหลุดออกเป็นแผ่นรูปทรงไม่
แน่นอน

ประโยชน์ : เปลือกใช้ย้อมผ้า

เนื้อไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์

สรรพคุณ : เปลือกและเมล็ดนำไปต้ม

เพื่อใช้ชะล้างบาดแผล




ตะบูนดำ

Xylocarpus moluccensis Koen.

วงศ์ : MELIACEAE

ชื่ออื่น : ตะบูน, ตะบัน (กลาง, ใต้)



เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 20-35 เมตร ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง โคนต้นมีพูพอนเล็กน้อย เรือนยอดเป็นพุ่มกลมเปลือกขรุขระ สีน้ำตาลเข้มแตกเป็นร่องตามยาว ต้นแก่เปลือกลอกเป็นแถบแคบๆ เปลือกหนาประมาณ 0.3-0.5 เซนติเมตร เนื้อไม้สีน้ำตาลมีรากหายใจ รูปคล้ายกรวยคว่ำ กลมหรือแบน ปลายมน ยาว 20-40 เซนติเมตร จากผิวดิน






จาก คู่มือฯ เกษตรกรรายเล่ม

ประโยชน์ : เปลือกนำมาใช้ย้อมผ้าและใช้ฟอกหนังเป็นพื้นรองเท้า เนื้อไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ และลำต้นใช้ทำเป็นพื้นกระดาน

สรรพคุณ : ผลและเปลือกใช้ต้มน้ำดื่ม ช่วยแก้อาการท้องเสีย ผลแห้งตากแห้งเผาไฟร่วมกับเห็ดพังกาและน้ำมันมะพร้าว ใช้สำหรับทาแก้มะเร็งผิวหนัง

ขั้นตอนการปลูก ต้นกล้าป่าชายเลน



ที่พักหลับสบาย



รัตธารา รีสอร์ท

ชวนคนรู้ใจมาสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ ดิฉันมีน้ำป่าชายเลน
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อีกทั้งยังมีบริการ ร้านอาหาร
และรับจัดประชุมสัมมนาแบบครบวงจร



09-2921-4393



<https://www.facebook.com/ratathararesort>



<https://www.ratathararesort.com>



55

จาก อุทยาน ป่าชายเลน

ร้านนี้สิเด็ด!

อู๊ดอาหารทะเล

หากนี่ก็อยากอาหารทะเลพื้นบ้าน
หลากหลายเมนู ราคาเยือกเยือกและ
วัตถุดิบสดใหม่แบบวันต่อวันใกล้
กรุงเทพมหานครต้องไม่พลาดที่นี่! รับรอง
ถูกปาก ถูกใจเหล่านักชิมทั้งหลาย

ทำเลที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิทสายเก่า
เยื้องลานอเนกประสงค์
สะพานเทพหัสดิน



0-3857-3703



<http://www.facebook.com/oodseafood>



แพเคียงน้ำ

ร้านอาหารในตำนานของท่าข้าม
บรรยากาศดี ติดริมแม่น้ำบางปะกง
พร้อมเสิร์ฟอาหารนานาชาติ ไม่ว่า
จะมาสักกี่ครั้งก็ติดใจไม่รู้ลืม

ทำเลที่ตั้ง : ข้างวัดทองนพคุณ
(วัดบางแสน)



08-9252-4666



Facebook : <http://www.facebook.com/Paekeingnambangpakong>

ส้มตำเจี๊ยะยง

ร้านอาหารบรรยากาศบ้านๆ แต่รสชาติแซ่บจัดจ้าน
ถึงใจไม่แพ้ใคร! เพราะที่นี่ครบเครื่องเรื่องความอร่อยทั้งส้มตำ
คอหมูย่างน้ำตก ต้มแซ่บ ฯลฯ จนต้องยกนิ้วให้



ทำเลที่ตั้ง : ข้างสนามกอล์ฟ Royal Lakeside Golf Club

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ เวลา



06-2263-6151



<http://www.facebook.com/somtumgunya>



ก๋วยเตี๋ยวเปิดครัวอีด

หากใครชื่นชอบรับประทานเนื้อ
เปิดต้องไม่พลาดร้านนี้ ซึ่งทางร้านได้นำ
เปิดตุ๋นยาจีน มาเป็นสูตรเด็ดของทางร้าน
ที่อร่อยจนไม่ต้องปรุงเพิ่ม นอกจากนั้น
ยังมีเมนูข้าวหน้าเป็ด ที่ใครเห็นเป็นต้อง
น้ำลายสออีกด้วย

ทำเลที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิทสายเก่า



08-8192-2461



Cafe สุดชัค

เทศบาลตำบลท่าข้าม



ลุงแกละ กาแฟสด

ร้านกาแฟสไตล์วินเทจ ที่เปิดให้บริการทั้งเบเกอรี่, กาแฟสดและเครื่องดื่มร้อน-เย็นอื่นๆ ให้คุณได้ลิ้มลอง สามารถเลือกนั่งได้ทั้งโซนห้องแอร์ และ Outdoor


ทำเลที่ตั้ง : สีแยกบางแสม ก่อนถึงโรงไฟฟ้าบางปะกง



09-9045-5356



<http://www.facebook.com/lungkaelakafasod>



การเดินทาง

ผู้สนใจสามารถมาเที่ยวชมได้ โดยเดินทางตามถนนเทพรัตน์ (บางนา-ตราด) ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง เลี้ยวกลับรถบริเวณช่องกลับรถที่ 2 (ก.ม.53) ซิดซ้าย เข้าเส้นทางคู่ขนาน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่แยกศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าบางปะกง จากนั้น ท่านสามารถเลือกเลี้ยวซ้ายหรือขวาเพื่อไปท่าเรือต่างๆ ได้ตามความพอใจ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลท่าข้าม

โทร. 038-573411-2



**ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม**

122 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทร. 0 - 3857 - 3411 - 2 ต่อ 114

โทรสาร. 0 -3857-3411 - 2 ต่อ 116



www.thakam.go.th



admin@thakam.go.th



กต.ท่าข้าม บางปะกง